

Les moyens de prévention

Vous travaillez au contact d'oiseaux ou de volailles

Respecter des mesures simples d'hygiène et de pratiques professionnelles

1. Hygiène vestimentaire

- Porter une tenue de travail (vêtements et chaussures spécifiques)
- Porter une blouse ou un tablier imperméable lors de la manipulation des animaux
- Utiliser une armoire à double vestiaire séparant les vêtements de ville et de travail
- Nettoyer régulièrement les vêtements de travail

2. Hygiène individuelle indispensable

- Se laver les mains après chaque manipulation des animaux
- Se laver les mains avant de boire, manger ou fumer
- Se laver au savon, désinfecter et mettre un pansement imperméable en cas de plaies
- Prendre une douche en fin de journée de travail en cas de travail salissant

3. Port de gants

- **Utiliser des gants en cuir** → Pour tout contact avec les perroquets et les perruches
- **Utiliser des gants à usage unique** → Pour tout contact avec les animaux
- **Utiliser des gants à usage unique** → Pour le nettoyage des cages
- **Utiliser des gants à usage unique** → Pour tout contact avec les déjections
- **PORTER IMPERATIVEMENT** des gants en cas de lésions même minimales au niveau des mains

4. Port de masque respiratoire FFP2

- Porter un masque pour le nettoyage des cages
- Porter un masque lors d'intervention sur des animaux malades

Dans tous les cas, respectez les consignes de sécurité de l'entreprise !

Plus d'informations sur : www.msa-idf.fr



MSA Ile-de-France
Santé - Sécurité au travail
161, avenue Paul-Vaillant-Couturier
94250 Gentilly

tél. 01 49 85 54 10
fax 01 49 85 56 88
www.msa-idf.fr



Santé - Sécurité au travail

> Les Zoonoses en Animalerie Jardinierie

Les zoonoses des oiseaux et des volailles

MSA Ile-de-France

Réalisation : PAO-Communication MSA IdF - Crédit photo : MSA IdF - Illustrations : Joyeux - Impression : - 06/2008



Principales zoonoses transmises par les oiseaux et les volailles

Nom de la maladie	Type de maladie Agent pathogène	Mode de transmission	Signes de la maladie chez l'homme
Ornithose - Psittacose perruches et perroquets, pigeons et canards...	Bactérie <i>Chlamydophila psittaci</i>	Contamination par voie respiratoire	• Durée d'incubation : 10 à 15 jours • Symptômes : fièvre élevée avec manifestation respiratoire, toux, forme grave possible
Campylobactériose	Bactérie <i>Campylobacter jejuni</i>	Contamination par contact mains-bouche avec les éléments souillés de matières fécales	• Durée d'incubation : 1 semaine • Symptômes : fièvre, douleurs abdominales, diarrhée, forme grave chez les personnes immuno déprimées
Salmonellose	Bactéries <i>Salmonella typhimurium</i> , <i>enteritidis</i> ...	Contamination par contact mains-bouche avec les éléments souillés de matières fécales	• Durée d'incubation : 12 à 24 heures • Symptômes : diarrhée, vomissements et fièvre
Yersiniose	Bactérie <i>Yersinia pseudotuberculosis</i>	Contamination par contact mains-bouche avec les éléments souillés de matières fécales	• Durée d'incubation : 1 à 10 jours • Symptômes : fièvre, douleurs abdominales, diarrhée
Giardiose	Parasite <i>Giardia intestinalis</i>	Contamination par contact mains-bouche avec les éléments souillés de matières fécales	• Durée d'incubation : 3 jours à 3 semaines • Symptômes : douleurs abdominales, diarrhée
Cryptosporidiose	Parasite <i>Cryptosporidium parvum</i>	Contamination par contact mains-bouche avec les éléments souillés de matières fécales	• Durée d'incubation : 2 à 14 jours • Symptômes : diarrhée, forme grave chez les personnes immuno déprimées
Tuberculose aviaire	Bactérie <i>Mycobacterium avium</i>	Contamination par voie respiratoire	• Durée d'incubation : plusieurs mois • Symptômes : chez personnes immuno déprimées uniquement
Grippe aviaire	Virus <i>Influenza A</i>	Contamination théorique par voie respiratoire	• Durée d'incubation : quelques jours • Symptômes : syndrome grippal probable et pneumonie

Très fréquent
 Rare
 Non concerné ou non démontré