

# Les moyens de prévention

## Je travaille au contact de bovins

Je mets en place des pratiques professionnelles adaptées et des mesures d'hygiène élémentaires :

### 1. Hygiène vestimentaire

- Je porte une tenue vestimentaire appropriée et réservée au travail
- Je nettoie régulièrement ma tenue de travail
- J'utilise une armoire vestiaire à double compartiment pour les vêtements de ville et de travail

### 2. Hygiène individuelle indispensable

- Je me lave les mains après la manipulation des animaux
- Je me lave les mains avant de boire, manger ou fumer
- Je prends une douche en fin de journée de travail
- En cas de plaie, je la nettoie au savon, je la désinfecte et je la protège avec un pansement imperméable. En cas de plaie grave, j'appelle le 15

### 3. Port de gants

- Je systématise le port de gants en cuir pour tout contact avec les animaux
- J'utilise des gants imperméables pour les travaux d'entretien, pour la manipulation des déchets animaux et des cadavres
- Je porte des gants jetables pour les soins (pansements, piqûres, application de produits vétérinaires...)
- Je pense à mettre impérativement des gants en cas de lésions même minimes au niveau des mains

### 4. Port de masque respiratoire FFP2

- Je porte un masque au contact d'un animal mort

**Dans tous les cas, je respecte les consignes de sécurité de l'entreprise !**

Plus d'informations sur : [www.msa-idf.fr](http://www.msa-idf.fr)

MSA Ile-de-France  
BP 137  
75664 Paris cedex 14  
[www.msa-idf.fr](http://www.msa-idf.fr)

Tél. : 01 30 63 88 90  
Fax : 01 49 85 53 90  
[contact.entreprise@msa75.msa.fr](mailto:contact.entreprise@msa75.msa.fr)



L'essentiel & plus encore

Santé - Sécurité au travail

> Les Zoonoses en élevage

Réalisation : PAC-Communication MSA IdF - Crédit photo : MSA IdF - Illustrations : Natacha BIGAN - Impression : Leicaux imprimerie - 01/2012.



# Les zoonoses des bovins

MSA Ile-de-France



**ON PEUT ÊTRE FORT COMME UN BOEUF  
ET PORTER UN EPI**

[www.msa-idf.fr](http://www.msa-idf.fr)



L'essentiel & plus encore

# Principales zoonoses transmises par les bovins

Nom de la maladie	Type de maladie Agent pathogène	Mode de transmission	Signes de la maladie chez l'homme
<b>Teigne</b>	Champignon : <i>Microsporum</i> ou <i>Trichophyton</i>	Contamination par contact cutané avec les animaux ou avec des éléments souillés	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Durée d'incubation</b> : une semaine</li> <li>• <b>Symptômes</b> : apparition de lésions au niveau des zones de contact avec les animaux (<i>cou, visage, avant-bras</i>), anneaux rougeâtres qui démangent</li> </ul>
<b>Charbon bactérien</b>	Bactérie : <i>Bacillus anthracis</i>	Contamination par contact cutané avec des animaux vivants ou morts ou inhalation de spores	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Durée d'incubation</b> : 2 à 5 jours</li> <li>• <b>Symptômes</b> : forme cutanée dans 90% des cas (<i>escarre noirâtre</i>), forme digestive avec des douleurs abdominales ou forme respiratoire avec évolution rapide et grave</li> </ul>
<b>Fièvre Q</b>	Bactérie : <i>Coxiella Burnetti</i>	Contamination par inhalation	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Durée d'incubation</b> : 2 à 3 semaines</li> <li>• <b>Symptômes</b> : syndrome grippal, complications possibles chez les sujets à risques</li> </ul>
<b>Brucellose</b>	Bactérie : <i>Brucella abortus bovis</i>	Contamination par contact cutané avec les animaux malades ou par ingestion de produits laitiers ou de viande crue	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Durée d'incubation</b> : 1 à 4 semaines</li> <li>• <b>Symptômes</b> : fièvres, courbatures, sueurs abondantes</li> </ul>
<b>Listériose</b>	Bactérie : <i>Listeria monocytogenes</i>	Contamination par contact cutané lors d'avortement ou de mise-bas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Durée d'incubation</b> : 3 à 70 jours, 3 semaines en moyenne</li> <li>• <b>Symptômes</b> : fièvre, fatigue, très rarement des lésions cutanées, risque d'avortement chez la femme enceinte</li> </ul>
<b>Salmonellose</b>	Bactérie : <i>Salmonella typhimurium, enteritidis</i>	Contamination par contact mains-bouche avec les éléments souillés	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Durée d'incubation</b> : 1 semaine</li> <li>• <b>Symptômes</b> : fièvre, douleurs abdominales, diarrhée, forme grave chez les personnes immuno-déprimées</li> </ul>
<b>Tuberculose bovine</b>	Bactérie : <i>Mycobacterium bovis</i>	Contamination par inhalation en respirant des aérosols	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Durée d'incubation</b> : variable</li> <li>• <b>Symptômes</b> : possibilité de fièvre modérée, fatigue générale, amaigrissement et symptômes qui dépendent de la localisation infectieuse</li> </ul>
<b>Encéphalopathie Spongiforme Bovine</b>	Protéine prion	Contamination par plaie avec outil souillé par des substances nerveuses contaminées ( <i>moelle épinière, nerf...</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Durée d'incubation</b> : plusieurs années</li> <li>• <b>Symptômes</b> : troubles de l'équilibre et de la sensibilité, puis démence et décès au bout d'un an</li> </ul>

Très fréquent  
 Fréquent  
 Rare

Théorique